SECRETARIA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA



LAMBDA CIHALOTRIN 10% [CS] P/V

Botes de HDPE de 25 ml. (sólo en aplicaciones manuales), botes de 250 ml. y 1 l. Garrafas de HDPE de 5 l. (sólo en aplicaciones con tractor).

**Envases** 





USO	AGENTE	Dosis	Condic. Especifico
Avena	PULGONES	0,075 l/ha	No sobrepasar la dosis de 0,075 l/Ha.
	GUSANOS GRISES	0,075 - 0,2 l/ha	
	MOSCA BLANCA		
Brécol	ORUGAS	0,0075 - 0,02 %	No sobrepasar la dosis de 0,20 l/Ha.
Cebada	PULGONES	0,075 l/ha	No sobrepasar la dosis de 0,075 l/Ha.
	GUSANOS GRISES	0,075 - 0,2 l/ha	
	MOSCA BLANCA		
Coliflor	ORUGAS	0,0075 - 0,02 %	No sobrepasar la dosis de 0,20 l/Ha.
	GUSANOS GRISES	0,075 - 0,2 l/ha	
	MOSCA BLANCA		
Colirrábano	ORUGAS	0,0075 - 0,02 %	No sobrepasar la dosis de 0,20 l/Ha. Máximo 2 aplicaciones separadas al menos 15 días.

61184 - 2022139 Página 1 de 4

Haba para grano	MOSCA BLANCA	0,015 - 0,02 %	No sobrepasar la dosis de 0,20 l/Ha.
Haba verde	MOSCA BLANCA	0,015 %	No sobrepasar la dosis de 0,15 l/Ha.
Judía para grano	MOSCA BLANCA	0,015 - 0,02 %	No sobrepasar la dosis de 0,20 l/Ha.
Judía verde	MOSCA BLANCA	0,015 %	No sobrepasar la dosis de 0,15 l/Ha.
Lechuga	PULGONES	0,0075 %	Solo al aire libre. Realizar una aplicación, con un máximo de 0,075 l/Ha, con un volumen de caldo de 1.000 l/Ha.
	CICADELIDOS		
	DELFÁCIDOS		
	GUSANOS GRISES		
	PULGONES	0,075 - 0,2 l/ha	
Maíz	TALADRO	0,0075 - 0,02 %	No sobrepasar la dosis de 0,20 l/Ha.
	CARPOCAPSA		
	CERATITIS		No sobrepasar la dosis de 0,125 l/Ha. Máximo 1 aplicación por campaña.
	CHINCHES		(Uso secundario). No sobrepasar la dosis de 0,125 l/Ha. Máximo 1 aplicación por campaña.
	Neophilaenus campestris		
	PHILAENUS SPUMARIUS		
Manzano	PULGONES	0,0075 - 0,0125 %	No sobrepasar la dosis de 0,125 l/Ha. Máximo 1 aplicación por campaña.
	PHILAENUS SPUMARIUS		
Olivo	PRAYS	0,0075 %	Aplicar un máximo de 0,075 l/Ha., antes de la apertura de las flores.
	ESCARABAJO	0,0075 - 0,02 %	
Patata	GUSANOS GRISES	0,075 - 0,2 l/ha	No sobrepasar la dosis de 0,20 l/Ha. Máximo 1 aplicación por campaña.
	CARPOCAPSA		
	CERATITIS	0,0075 - 0,015 %	No sobrepasar la dosis de 0,15 l/Ha. Máximo 1 aplicación por campaña.
	CHINCHES	0,0125 %	Uso secundarioAplicar un máximo de 0,125 l/Ha. con un volumen de caldo de 500-1.000 l/Ha. Máximo aplicación por campaña.
	Neophilaenus campestris		- присости роговитроно.
	PHILAENUS SPUMARIUS		
	PSILA	0,0075 - 0,015 %	No sobrepasar la dosis de 0,15 l/Ha. Máximo 1 aplicación por campaña.
Peral	PULGONES	0,0125 %	Aplicar un máximo de 0,125 l/Ha. con un volumen de caldo de 500-1.000 l/Ha. Máximo 1 aplicación por campaña.
Pimiento	MOSCA BLANCA	0,015 - 0,02 %	No sobrepasar la dosis de 0,20 l/Ha.
Remolacha azucarera	PULGONES	0,015 %	No sobrepasar la dosis de 0,15 l/Ha. Máximo 2 aplicaciones separadas al menos 15 días.
	GUSANOS GRISES	0,075 - 0,2 l/ha	Efectuar un tratamiento generalizado al suelo a la aparición de la plaga sin sobrepasar los 0,25 l/Ha. y un volumen de caldo de 500-1.000 l/Ha.
	MOSCA BLANCA		an rolanion do data do dos nodo in la.
Tomate	ORUGAS	0,0075 - 0,025 %	Solo al aire libre. Realizar 2 aplicaciones separadas al menos 10 días a una dosis máxima de 0,25 l/ha Para cultivo en parral o espaldera aplicar dosis de 0,0075-0,015% con un máximo de 0,15 l/Ha.
Trigo	PULGONES	0,075 l/ha	No sobrepasar la dosis de 0,075 l/Ha.

SECRETARIA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

**Página** 2 **de** 4

SECRETARIA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)					
USO	P.S. (días)				
Pimiento, Tomate	3				
Brécol, Coliflor, Colirrábano, Haba para grano, Haba verde, Judía para grano, Judía verde, Manzano, Peral, Remolacha azucarera	7				
Lechuga, Patata	14				
Avena, Cebada, Trigo	28				
Maíz	60				
Olivo	NP				

#### **Condiciones Generales de Uso**

Aplicar en pulverización normal mediante aplicación manual y con tractor a la aparición de la plaga, con un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha en peral, manzano, tomate, brécol, coliflor, colirrábanos y patata; 1.000 l/ha en olivo, judía verde y judía para grano, pimiento, lechuga y remolacha azucarera y 500 l/ha en trigo, maíz, avena y cebada.



J\_U 7

#### Clase de Usuario

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.



# Mitigación de riesgos en la manipulación

El aplicador deberá utilizar guantes de protección química adecuados durante la mezcla/carga, aplicación y limpieza del equipo. Durante la aplicación del producto se utilizará ropa de protección química para el tronco y las piernas tipo 4 (hermética a productos líquidos).

No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

Por motivos de seguridad, en peral, manzano y patata se deberá realizar como máximo 1 aplicación por campaña. En el caso de ser necesario un mayor número de aplicaciones, éstas deberán realizarse con productos que no sean de la misma familia química.

En tomate se utilizarán guantes de protección adecuados durante el desarrollo de actividades posteriores al tratamiento.

SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

SPo 4: El recipiente debe abrirse al aire libre y en tiempo seco.



**Página** 3 **de** 4

SECRETARIA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

	Clasificaciones y Etiquetado
Clase y categoría de peligro (Humana)	Toxicidad aguda. Categoría 4.
Pictograma	
Palabra de Advertencia	Atención
Indicaciones de Peligro	H302+H332 -Nocivo en caso de ingestión o inhalación.
Consejos de Prudencia	P304+P340 -EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P330 -Enjuagarse la boca. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P264 -Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P270 -No comer, beber ni fumar durante su utilización. P271 -Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	Acuático agudo 1 Acuático crónico 1
Pictograma	SHS09 (medio ambiente)
Palabra de Advertencia	Atención
Indicaciones de Peligro	H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de Prudencia	P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P273 -Evitar su liberación al medio ambiente. P391 -Recoger el vertido.



SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 10 m. con cubierta vegetal en cultivos herbáceos y de 40 m. en cultivos leñosos hasta las masas de agua superficial. Con utilización de boquillas de reducción de la deriva del 95% respetar en cultivos leñosos una banda de seguridad de 10 m. hasta las masas de agua superficial.

SPe 3: Para proteger los artrópodos no objeto del tratamiento, respétese sin tratar una banda de seguridad de 30 m. en cultivos arbóreos y 5 m. en cultivos extensivos hasta la zona no cultivada o cultivos

adyacentes.

SPe 8: Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración de los cultivos. No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo. Retírense o cúbranse las colmenas durante el tratamiento y no destaparlas hasta 1 o 2 horas después de concluido.

### **Gestión de Envases**

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador). Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

# **Otras Indicaciones reglamentarias**

En la etiqueta deberá figurar la frase: "contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica".

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

.....







Página 4 de 4 61184 - 2022139